

# آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدّة الموجبة في المدارس

النسخة الأولى أغسطس 2021

## وقاية

هيئة الصحة العامة  
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



# إجراءات رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة

## تعريف:

- **حالة مشتبهة:** هي الحالة التي تظهر عليها أعراض الاشتباه (تنفسية) لمرض كوفيد-19 (ارتفاع في درجة الحرارة – كحة – عطاس – ضيق بالتنفس - ألم في المفاصل وغيرها).
- **الحالة المؤكدة:** هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبرياً بفحص الـ **PCR**
- **الحالة الثانوية بالمدرسة:** هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبرياً بفحص الـ **PCR** ويوجد تاريخ مخالطة وثيق مع الحالة الأساسية و**عدم وجود تاريخ مخالطة لمصدر خارج المدرسة.**
- **المخالطة الوثيقة:** هي المخالطة التي تكون عن مقربة (مسافة اقل من متر ونصف) وفي فترة أطول من 15 دقيقة وبدون ارتداء الكمامة او ارتدائها بشكل غير صحيح.

## الإجراءات التي يجب عملها عند رصد حالة مشتبهة:

- عزل الحالة في الغرفة المخصصة لعزل الحالات المشتبهة.
- التطهير والتعقيم للاماكن التي تواجد فيها الطالب.
- التواصل مع ولي امر الطالب لأخذ الطالب وتوجيهه باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبهة.
- متابعة الحالة وتوجيهها بضرورة اخذ المسحة.
- متابعة نتيجة المسحة وحالة الطالب في تطبيق توكلنا .
- إبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة (الطب الوقائي – الصحة المدرسية).



## رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة في الفئات مكتملة التحصين ( اكبر من 12 سنة

- **في حال ظهور أعراض وكانت النتيجة سلبية لكوفيد- 19 :**
  - إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
  - عودة الطالب بعد زوال الاعراض لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة أو وفقاً لتقرير الطبيب المعالج .
  - التأكد من حالة توكنا للطالب.
- **في حال ظهور نتيجة إيجابية لكوفيد-19 في الفئات السنية أكثر من 12 سنة (محصنين بجرعتين):**
  - إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص.
  - حصر المخالطين واعداد قائمة بأسمائهم
  - لا يحتاج الطلاب المخالطين للعزل فقط يتم مراقبتهم لمدة 10 أيام ومتابعة ظهور الاعراض.
  - إبلاغ إدارة الطب الوقائي وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة.

## حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات اكبر من 12 سنة

- **في الفئات السنية اكبر من 12 سنة (محصنين بجرعتين):**
  - في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لنفس الفصل:
  - يتم حصر المخالطين الوثيقين للحالة ومتابعة ظهور الأعراض لمدة 10 أيام.
  - يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي).
  - يتم التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى.
  - في حال ظهور حالاتين او اكثر مخالطة للحالة الاولى تنتمي لنفس الفصل:
  - إيقاف العمل بالفصل لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
  - يتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل بالفصل بحسب مرنّيات الصحة العامة.
  - يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.



## حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات اكبر من 12 سنة (تابع)

### • في الفئات السنية اكثر من 12 سنة (محصنين بجرعتين):

- في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (اقل من 3 فصول):

- يتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في الفصول بحسب مرئيات الصحة العامة.
- يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.

- في حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (3 فصول او اكثر):

- يتم تعليق العمل في المدرسة لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة.
- يتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في المدرسة بحسب مرئيات الصحة العامة.
- يتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.

